

S

C



БУЗИН

700 г/кг метрибузин

ХЕРБИЦИД СРЕЦУ

ЕДНОГОДИШНИ

ШИРОКОЛИСТНИ

И НЯКОИ ЖИТНИ

ПЛЕВЕЛИ

За условията в Република България Бузин е одобрен за употреба както следва:

| Култура | Доза на употреба |
|---------|---|
| Картофи | 75 г/дка - след засаждане преди поникване |

Вид на формулацията:

Вододиспергируеми гранули (ВГ)

Действие на
продукта върху
следващи в
сеитбооборота култури:

При регистрираните дози не са забелязани негативни въздействия. Не третирайте сортове картофи Draga, Jarla и Vivaх, тъй като е установена чувствителност към продукта.

Прилага се за контрол на следните плевели:

Alopecurus myosuroides (лусича онашка), *Amaranthus* spp. (вигове щир), *Anagallis arvensis* (полско огнивче), *Atriplex patula* (разстлана лобода), *Capsella bursa-pastoris* (овчарска торбичка), *Centaurea cyanus* (синя метличина), *Chenopodium album* (бяла куча лобода), *Chenopodium* spp. (вигове лобода), *Digitaria sanguinalis* (кръвно просо), *Fumaria* spp. (вигове росокас), *Geranium* spp. (вигове згравец), *Lamium* spp. (вигове мъртва коприва), *Lolium* spp. (вигове райграс), *Matricaria chamomilla* (лайка), *Mercurialis annua* (едногодишен пролез), *Panicum* spp. (вигове гуво просо), *Poa annua* (едногодишна метличина), *Polygonum* spp. (вигове пипериче), *Portulaca oleracea* (мученица), *Raphanus raphanistrum* (гува ряпа), *Senecio vulgaris* (обикновен спореж), *Sinapsis arvensis* (гув синан), *Sonchus oleraceus* (градински кострец), *Spergula arvensis* (полска колянка), *Stellaria media* (врабчови чревица), *Thlaspi* spp. (вигове попова лъжичка), *Urtica dioica* (коприва), *Veronica* spp. (великденче) и др.