



ДОМИНАТОР

НЕСЕЛЕКТИВЕН, ЛИСТЕН, СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД
ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ И
МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Разтворим концентрат (СЛ)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Непрофесионална

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

Доминатор е системен хербицид, който се поема от зелените части на пълвелите и се транслоцира до всички растежни точки, включително подземните коренища и коренови издънки на многогодишните пълвели. Препарата действа върху ензимите, необходими за синтеза на аминокиселини. Вследствие на това действие пълвелите постепенно пожълтяват, некромтизират и загиват. (Едногодишните пълвели загиват до 2-3 дни, а многогодишните до 15 – 20 дни.)

ПРЕДИМСТВА:

С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА АДЖУВАНТИ - НАД 12%

- по-бързо абсорбиране на активното вещество в пълвелите
- по-бързо проникване
- по-бързо и сигурно загиване
- по-малко препарат, по-бързо действие

БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТАЛОЛАМИН

**НЯМА НЕГАТИВНО ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ
ЗА СЛЕДВАЩАТА КУЛТУРА В СЕЙТБООБОРОТА**



ДОМИНАТОР УЛТРА

360 г/л глифозам

Регистрации в България:

Култура	Контролирани плеべли	Доза
Лозя	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плеべли	300 мл/гка

Приложение:

По време на вегетацията с насочено пръскане

ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ

480 г/л глифозам

Регистрации в България:

Култура	Контролирани плеべли	Доза
Стърнища	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плеべли	300-900 мл/гка

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:

- Третирането се извършва във фаза бутонизация на широколистните и фаза изкласяване на житните плеべли.
- За постигане на максимален ефект, плеべлите трябва да са развили достатъчна листна маса, за да може препарата да се поеме добре и да постигне до всички точки на разтеж.
- При пръскането на овощни градини и лозя, третирането да бъде насочено към плеべлите, така че работния разтвор да не попада върху зелените части на лозята и овощните дръвчета.
- Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по - Висока от 24 - 25 градуса.
- Да се вземат всички предпазни мерки Доминатор да не попада върху съседни култури до пръскания блок.
- Да не се провежда пръскане, ако се очаква валеж до 4-5 часа след третирането.

Регистрации по света срещу едногодишни и многогодишни плеべли - зърнени култури, железопътни линии, овощни, широколистни храстови, иглолистни сървета, маслодайна рапица, трева, места за извеждане от експлоатация, стърнища, пътешки, пасища, лозя, лилави, декоративни растителни култури, захарно цвекло. Страни - Австрия, Белгия, Швейцария, Германия, Дания, Франция и др.

