



ФАСТРИН 10 ЕК

АЛФА - ЦИПЕРМЕТРИН - 100 г/л



ПИРЕТРОИДЕН
ИНСЕКТИЦИД
С КОНТАКТНО,
СТОМАШНО
И РЕПЕЛЕНТНО
/ОТБЛЪСКВАЩО/
ДЕЙСТВИЕ

ФОРМУЛАЦИЯ:

Емулсионен концентрат

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

Втора професионална

Култура	Вредител	Доза	Момент на приложение
Пшеница, ръж, тритикале	Листни въшки /Rhopalosiphum padi Sitobion avenae Metopolophium dirhodum Schizaphis graminum/	10 мл/гка	При поява на неприятеля /след ВВСН 11/ разтворен първи лист/
Пшеница, ръж, тритикале	Листни въшки /Rhopalosiphum padi Sitobion avenae Metopolophium dirhodum Schizaphis graminum/	15 мл/гка	При поява на неприятеля /след ВВСН 65/ пълен цъфтеж: 50% от прашниците са зрели

Количество вода - 40 - 50 л/гка

Смесимост:

Може да се смесва с повечето от употребяваните в практиката хербициди, фунгициди, инсектициди, листни торове, растежни регулатори. Преди смесване да се извърши тест за физическа съвместимост.



Механизъм на действие:

Фастрин 10 ЕК действа на централната и периферната нервна система, като предизвиква бърза парализа. Това води до нарушения в метаболизма и физиологичните функции на неприятеля.

Предимства:

- Бърз инициален ефект
- Пиретроидите на база алфа циперметрин се характеризират с широк спектър на действие и отличен контрол на икономически важните неприятели
- Комбинирано действие
- Прилаган е срещу гризещи и смучещи насекоми.
- Контролира ларви, нимфи и възрастни форми на неприятелите.

