

ИМПАКТ 25СК

<p>Активно вещество: Флутриафол 250 г/л</p> <p>Формуляция: Суспензионен концентрат (СК)</p> <p>Карантинен срок: 30 дни</p> <p>Категория на употреба: III-та – свободна употреба</p>	<p>Системен фунгицид от групата на триазолите за борба срещу икономически най-важните болести по зимни зърнено-житни култури</p>	
---	--	--

За условията на Република България Импакт е одобрен за употреба както следва:

култура	болест	доза	време на приложение
Пшеница, ечемик	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>)	50 мл/га	При поява на първи признаци на болестта
Пшеница	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>) Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>)	50 мл/га	При поява на първи признаци на болестта
Захарно цвекло	Брашнеста мана (<i>Erysiphe communis</i>) Церкоспороза (<i>Cercospora beticola</i>)	25 мл/га	При поява на първи петна. Следващите 1-2 пръскания са през 7-10 дни.



брашнеста мана



жълта ръжда



кафява ръжда

Механизъм на действие:

ИМПАКТ 25 СК е фунгицид с контактно (предпазно) и системно (лечебно) действие. При пръскане препаратът се поема от листната повърхност, прониква в проводящата тъкан и чрез ксилема се разпространява акропетално в цялото растение, включително в новия подрост след пръскане. Унищожава причинителя на болестта чрез инхибиране биосинтезата на ергостерол, стопиране растежа на хифите и разрушаване на клетъчната стена на гъбата-патоген.

Смесимост:

Може да се смесва с други инсектициди и фунгициди, но задължително да се направи предварителен тест за съвместимост между двата продукта.

Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

- ИМПАКТ 25 СК е напълно селективен за пшеницата, ечемика и захарното цвекло и не предизвиква нежелани ефекти (фитотоксичност) в регистрираните дози.
- Няма негативно последствие на следващата култура в сеитбооборота.

