

Клиофар® 600

КЛОПИРАЛИД - 600 г/л

Клиофар 600 СЛ е селективен, листен, системен хербицид за борба срещу едногодишни широколистни пlevели, както и срещу паламида, по време на вегетацията при пшеница, ечемик, овес, ръж, захарно и кръмно цвекло, зеле, карфиол, царевица, рагица, лук и ряпа

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Разтворим концентрат (СЛ)

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Особено чувствителни са плевелите от сем. Сложноцветни, Картофови, Бобови и редица други като ленка (*Galium aparine*), лайка (*Matricaria spp.*), бутрак/свинница (*Xanthium strumarium*), паламида (*Cirsium arvense*), пурпурче (*Anthemis arvense*), фасулче (*Polygonum convolvulus*), метличина (*Centaurea cyanus*), къклица (*Agrostemma githago*), млечок (*Euphorbia cyparissias*), спореж (*Senecio vulgaris*), глухарче (*Taraxacum officinale*), пача трева (*Polygonum aviculare*), колендро (*Biflora radians*), кострец (*Sonchus spp.*), галинзога (*Galinsoga parviflora*), слънчоглед (*Helianthus annus*), самосевки, устойчиви на сульфонилуреи и имидазолинони

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Клиофар 600 СЛ се поема чрез листата и се придвижи бързо, унищожава както централния корен, така и кореновите издънки и спящите пънки.

Клиофар 600 СЛ е пиридинов синтетичен ауксин (група 4) хербицид и унищожава плевелите, като блокира растежа на клетките в меристемните тъкани. Засегнатите растения спират своята вегетация до една седмица, не са конкуренти на културата, постепенно проявяват признаки на хлороза, некроза и в течение на 5-6 седмици след третиране загиват напълно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Най-добър ефект Клиофар 600 СЛ има когато плевелите се третират в период на активен растеж и оптималната им фаза е 2 - лист. Най-добър ефект срещу паламида във фаза розетка.

Регистрации в България:

Култура	Плевели	Фаза на културата	Доза мл/гка	Работен разтвор	Максимален брой приложения	Карантинен срок /в дни/
Пшеница, ечемик, овес, ръж		Начало на братене на културите - видим първи брат - до флагов лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима BBCH 21-39	17 мл/гка	20 – 40 л/гка	1	-
Захарно и кръмно цвекло		Начални фази на развитие BBCH 11-33-видима 1-ва гвойка листа още неразтворени до листата покриват 30% от повърхността	25 мл/гка	15 – 40 л/гка	1	42
Зеле, карфиол	За едногодишни и многогодишни широколистни плевели	Разтворен втори същински лист до 9-ти или повече същински листа разтворени BBCH 12-19	25 мл/гка	20 – 40 л/гка	1	-
Царевица за зърно		От трети до шести лист BBCH13-16	17 мл/гка	20 – 40 л/гка	1	90
Маслодайна рапица	Предпочитана употреба - ранни фази на плевелите	Разтворен втори същински лист до 9 или повече листа оформени BBCH 12-19	25 мл/гка	20 – 40 л/гка	1	56
Лук		Котиледонът като кукичка е с цвят зелен - растежът продължава до 4 лист BBCH 11-14	25 мл/гка	15 – 40 л/гка	1	-
Ряпа		Разтворен втори същински лист до 9 или повече същински листа оформени BBCH 12-19	25 мл/гка	20 – 40 л/гка	1	-



AGROCHEMICAL

ПРЕДИМСТВА

- Отличен контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни пълвели при голям брой култури
- Клиофар 600 е синтетичен ауксин, с механизъм на действие, различаващ се от този на използваните в момента хербициди на база Силфонилуреи, гарантиращ висока ефикасност
- Системното действие гарантира отлична ефикасност върху кореновата система. Ефикасен срещу самосевки слънчоглед (включително и от Clearfield и Express устойчиви хибриди)
- Дълъг период (прозорец) за приложение при житни култури от фаза братене до появя на флагов лист, осигурява контрол на пълвелите през цялата вегетация
- Пълна селективност за културите, дава възможност за достигане на потенциала за добив

СМЕСИМОСТ

Клиофар 600 СЛ е смесим с регистрираните продукти за растителна защита, но поради различната твърдост и реакция на водата, препоръчваме да се направи тест за смесимост и поносимост от растенията.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕЙТБООБОРОТА КУЛТУРИ

Незаровени пълвелни остатъци могат да окажат влияние върху следващи култури. Не засявайте бобови, картофови, моркови и др. подобни култури при незаровени остатъци от предшественик/пълвели, третирани с Клиофар 600 СЛ.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН

Не се препоръчва третиране на култури, подложени на стрес вследствие на мраз, засушавания и на воднения, големи дневни и нощи температурни амплитуди. Клиофар 600 СЛ не трябва да се прилага, когато реколтата е влажна или когато се очакват валежи в следващите шест часа. Да не се прилага при времето време и да се избегне разпръскване върху чувствителни култури (например картофи за семе), нецелеви растения извън целевата зона.

На площи, третирани с продукта, да не се засяват/засаждат култури, при които не е разрешена употребата на продукти, съдържащи клопиралид за срок до 125 дни след приложение на продукта. Култури, повторно засети в рамките на 125 дни след приложението на продукта, да не се третират с продукт, съдържащ клопиралид.