

# КОРАГЕН 20 СК

**Активно вещество:**

200 г/л ринаксипир  
(хлорантранилипрол)

**Формулация:**

Суспензионен концентрат (СК)

**Категория на употреба:**

Непрофесионална

Защита на царевица,  
зеленчуци, овощни, лозя  
от най-висок клас  
Отличен контрол  
на вредители  
и висока толерантност  
към полезните видове

**Механизъм на действие:**

Кораген 20 СК е нов антраниламиден инсектицид, притежаващ принципно нов начин на действие. Кораген 20 СК действа контактно и стомашно на неприятелите. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт


Кораген 20 СК е нов етап в борбата срещу царевичния стъблопробивач и ноценките, което води до гарантирано високи добиви, отлично качество на зърното и възможност за постигане на висока цена и печалба при реализацията на продукцията

Кораген 20 СК действа върху:

- яйцата
- новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпването
- новоизлюпените ларви при контакт с изсъхналият работен разтвор, при започване на движението им
- новоизлюпените ларви при поглъщане, когато започнат първите взривания

**Карантинен срок:**

Картофи - 14 дни; Овощни (ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи) - 14 дни; Орехи, кестени, бадеми, лешници - 21 дни; Лозя - 30 дни винени, 3 дни десертни; Домати и патладжани - 1 ден; Царевица - 7 дни



**Регистрации в България:**

култура	болест	гоза	време на приложение
<b>Зърнено фуражни и сладка царевица</b>	Царевичен стъблопробивач <i>Ostrinia nubilalis</i> Нощенки <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Spodoptera litoralis</i>	<b>10-15 мл/га</b>	При достигане на икономически праг на вредност / ИПВ/ ИПВ за царевичен стъблопробивач - 10 броя яйчни купчинки на 100 растения (ВВСН 14-55 и 73-87)
<b>Картофи</b>	Колорадски бръмбар Картофен молец	<b>6 мл/га 12,5-17,5 мл/га</b>	От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и първи взривания (ВВСН 31-93)
<b>Овощни (ябълки, круши, праскови, нектарини, кайсии, сливи)</b>	Ябълков плодов червей, Листоминиращи молци, Листозавивачки, Сливов плодов червей Източен плодов червей Малка зимна педомерка Прасковен клонков молец	<b>16-30 мл/га</b>	От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и първи взривания
<b>Орехи, кестени, бадеми, лешници</b>	Плодови червеи, кестенов хоботник, Прасковен молец, Лешников хоботник	<b>18-30 мл/га</b>	От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и първи взривания (ВВСН 73-87)
<b>Лозя (винени и десертни сортове)</b>	Гроздови молци Малка лозова листозавивачка	<b>15-27 мл/га</b>	От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и първи взривания (ВВСН 57-85)
<b>Домати и патладжани</b>	Нощенки, Доматен минаращ молец	<b>14-20 мл/га</b>	От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и първи взривания (ВВСН 71-89)

