



ТРИНУ 75 ВГ



Системен,
вегетационен
хербицид
за контрол
на широколистни
пълвели
в житни култури

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
750 г/кг трибенурон-метил

ФОРМУЛАЦИЯ:
Вододиспергируеми гранули ВГ

КАРАНТИНЕН СРОК (ДНИ):
не се изисква

Култура	Вредител	Момент на приложение	Доза
пшеница, ечемик /зимен и пролетен/, тритикале, овес /зимен и пролетен/, ръж	Широколистни пълвели	Фаза на културата BBCN 12 - 39 от гъба листа разтворени до флагов лист е напълно разтворен, лигулатата е едва видима	2 г/гка

Трину 75 ВГ е ефективен в много ниски дози за борба с голем брой широколистни пълвели, включително устойчиви на 2.4 Д при пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале. Той е високо селектичен за културите с доказан широк интервал на употреба. Поради краткия остатъчен ефект на Трину 75 ВГ в почвата и малката доза няма ограничения за следващата култура. Приложим е в широк температурен интервал /5-25 градуса/.

Механизъм на действие:

Трину 75 ВГ принаадлежи към групата на сулфонилуреите. Той действа чрез инхибиране на ензима ацетолактат синтаза (ALS), бързо предизвиква спиране на растежа на чувствителните плевели, които загиват след 3 до 6 седмици /како през това време те не са конкурент на културата за вода и светлина/. По-устойчивите плевели остават стопирани и затормозени.

Трину 75 ВГ е селектичен при всички съвременни сортове твърда и мека пшеница, зимен и пролетен ечемик, тритикале и ръж.

Препоръчки при употреба:

Трину 75 ВГ е най-ефикасен когато се прилага в ранна фаза от развитието на плевелите. Третирането трябва да се извърши след фаза 2-ри лист на културата и 2-4 лист на плевелите.

Прибавянето на сърфактант (прилепител; подобрител) към работния разтвор значително увеличава ефикасността на препарата.

Трину 75 ВГ може да се комбинира и с други хербициди. Когато се използва с други продукти, първо поставете в резервоара Трину 75 ВГ, после партнирация продукт и накрая прилепител при пълна доза на пръскачка.

Да се третира при спокойно време без валеж или вятър.

Трину 75 ВГ да не се прилага при култури, страдащи от стрес в резултат на сула, слабо развитие на културата, преовлажняване, ниски температури, нападение от болести и неприятели, при зърнено-житни култури подсътни с тревни смески, детелина или други бобови или широколистни култури, при зърнено-житни култури последователно или в резервоарна смес с хербициди на база сулфонилуреа. Валеж, паднал 2 часа след приложението на ТРИНУ 75 ВГ, не се отразява на хербицидния му ефект.



пalamida



ленка




гув мак



ляйка



врабчови чревца



гув синап

Спектър на действие:

- Anagallis arvensis*- обикновено огнивче
- Anthemis spp.*- полско поддумче
- Amaranthus retroflexus*- обикновен щир
- Atriplex spp.* - разстлана лобода
- Bifora radians* – колендро
- Vicia spp.* - видове глухина
- Adonis spp.*- слети коса; летен гороцвет; кукувиче око
- Chrysanthemum segetum*- полска маргаритка
- Calendula arvensis*- полски невен
- Capsella bursa-pastoris* - овчарска торбичка
- Chenopodium album*-бяла кучка лобода
- Dipotaxis erucoides*-гипломаксис
- Descuraria sophia* - войничича
- Galeopsis tetrahit*- петнистата бударница
- Geranium spp.* - здравец
- Lamium amplexicaule*- мърмвя коноприя
- Lepidium spp.* - видове горуха
- Lithospermum arvense*- врабчови чревца
- Lactuca serriola* - салата компасна
- Matricaria spp.* - лайка
- Malva spp.* - видове слез
- Miagrum perforiatum* - скърбица
- Oxalis spp.* - видове киселиче
- Papaver rhoeas*- гигантски мак
- Polygonum persicaria*- пинериче
- Polygonum aviculare* - пача трева
- Polygonum convolvulus*- почитницовидно фасулче
- Senecio vulgaris*- обикновен спореж
- Sinapis arvensis* , *Myosotis arvensis* , *Brassica nigra* - синап
- Euphorbia exigua*- млечка
- Spergula arvensis*- обикновена колянка
- Stellaria media*- врабчови чревца; звездичка
- Solanum nigrum* - черно куче грозде
- Silene alba* - пълоскавиче
- Thlaspi arvense*- попова лъжичка
- Urtica urens*- коноприя
- Galium spp.* - ленка
- Helianthus annuus*- самосевка слънчоглед
- Raphanus raphanistrum*- гигантски репа
- Ranunculus arvensis* - лютиче
- Rumex spp.*- ланаг
- Taraxacum officinale* - глухарче
- Centaurea cyanus*- мемличина
- Cirsium arvense*- паламига
- Viola arvensis* ; *Viola tricolor* - полска , трицветна теменуга
- Устойчиви**
- Convolvulus arvensis* - почитница
- Veronica spp.* - великденче
- Fumaria spp.*- лечебен росопас; димянка; горчица
- Борбата с ленката задължително се извежда с прибавяне на прилепител. Този плевел е чувствителен в ранни фази на развитие (7-10 см).
- Борба с паламига, самосевка слънчоглед - да се прибави прилепител, 10 - 15 см височина на плевелите